

Veno SL® 300 Kapseln enthalten den hochaktiven Wirkstoff Troxerutin, der die Begleiterscheinungen und Beschwerden, nämlich Brüchigkeit der KapillargefäÙe und Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe, durch seine entwässernden und gefäÙabdichtenden Eigenschaften wirkungsvoll bekämpft. Venöse Blutstauungen in den Beinen lassen nach. Wasseraustritt in das umgebende Gewebe wird durch die abdichtende Wirkung verhindert. In der Folge verbessern sich Durchblutung und Ernährung des Gewebes. Zusätzlich werden Schwere und Spannungsgefühl in den Beinen, Kribbeln, Müdigkeit und nächtliche Wadenkrämpfe beseitigt.

Troxerutin ist der alleinige Wirkstoff in den Veno SL® 300 Kapseln. Er wird aus dem Pflanzeninhaltsstoff Rutin - früher Vitamin P genannt - hergestellt. Troxerutin wird rasch vom Körper aufgenommen und verwertet. Veno SL® 300 Kapseln sind außerordentlich gut verträglich und somit besonders zur Langzeittherapie geeignet. Sie können auch während und nach einer Schwangerschaft eingenommen werden.

Damit die Beschwerden möglichst schnell und nachhaltig verschwinden, sollten Sie zu Beginn der Behandlung und bei akuten Anlässen (starke Belastung oder heißes Wetter) die empfohlene Höchstdosis einnehmen (3 x 2 Kapseln pro Tag). Der Erfolg der Behandlung hängt wesentlich von der regelmäßigen Einnahme ab.

Liebe Patientin! Lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Veno SL® 300

Kapseln

Wirkstoff: Troxerutin

Zusammensetzung:

1 Kapsel enthält

- **arzneilich wirksamer Bestandteil**

Troxerutin 300 mg

- **sonstige Bestandteile**

Povidon, Magnesiumstearat, Talkum, Siliciumdioxid, Gelatine, Farbstoffe E 127, E 132, E 171, E 172

Darreichungsform:

50 Kapseln (N2)

100 Kapseln (N3)

Wirkungsweise:

Troxerutin wirkt der Bildung von Ödemen entgegen (Ödemprotektivum), und verbessert die Fließfähigkeit des Blutes.

URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken,

Tel. 06805/9292-0, Fax 06805/9292-88

Anwendungsgebiete:

Zur unterstützenden Behandlung bei Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (exsudative Prozesse), zur Stabilisierung von feinen, brüchig werdenden BlutgefäÙen (Kapillarfragilität).

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Veno SL® 300 nicht anwenden?

Dieses Arzneimittel sollte bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Die Verwendung von Veno SL® 300 während der Schwangerschaft und Stillzeit ist möglich.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Keine

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Veno SL® 300 nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Veno SL® 300 sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Veno SL® 300 und wie oft sollten Sie Veno SL® 300 einnehmen?

Erwachsene nehmen 3mal täglich 1 Kapsel ein. Zu Beginn der Behandlung und bei Bedarf kann die Dosis auf 3mal täglich 2 Kapseln erhöht werden.

Wie und wann sollten Sie Veno SL® 300 einnehmen?

Nehmen Sie die Kapseln bitte mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. ein Glas Wasser) nach den Mahlzeiten unzerkaut ein.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Veno SL® 300 auftreten?

In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen, leichte Magen-Darm-Störungen, Flush (Gesichtsröte) oder Kopfschmerzen auftreten, die nach Absetzen des Präparates rasch abklingen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Seitenlasche aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nach diesem Datum nicht mehr!

Wie ist Veno SL® 300 aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

Stand der Information:

Januar 2001

Angabe gemäß § 109, Abs. 1, Arzneimittelgesetz:

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Allgemeine Hinweise für den Patienten:

Venenleiden gehören zu den häufigsten Krankheiten in unserer Zivilisationsgesellschaft. Sie entwickeln sich schleichend. Besonders Frauen sind betroffen. Das Blut fließt nicht von alleine "bergauf" zum Herzen zurück, sondern muß vom Herzen zurückgesaugt werden. Die Saugarbeit des Herzens wird durch die sogenannte "Muskelpumpe" der Beine unterstützt. Bei jedem Schritt drücken die Muskeln in Unter- und Oberschenkel die Venen so zusammen, daß das Blut in Richtung Herz fließt. Körperliche Bewegung spielt hier eine wichtige Rolle. Bei überwiegend sitzender oder stehender Lebensweise arbeitet die "Muskelpumpe" nur ungenügend, wodurch das venöse Blut langsamer aus den Beinen abzurückfließt.

Hinzu kommt bei Frauen die zusätzliche Belastung durch Schwangerschaften.

Überdehnung der Venen, sichtbar als Krampfadern und Brüchigkeit der feinen Gefäße, Blutstauungen mit anschließendem Austritt von Flüssigkeit in das umgebende Gewebe, fühlbar als dicke, schwere Beine, sind die Folgen. Länger bestehende Blutstauungen und Schwellungen können zu Venenentzündungen und Thrombosen führen, schließlich zu den gefürchteten offenen Beinen.